Hsa_circ_USP42 竞争性结合 miR-182-5p 抑制三阴性乳腺癌转移的机制研究

于金玲^{1,2}, 高蓓敏², 沈卫达², 崔静², 王浩峰², 朱江帆¹

(1. 同济大学附属东方医院普外科, 上海 200120; 2. 上海市长宁区妇幼保健院乳腺科, 上海 200051)

【摘要】目的 探索 hsa_circ_USP42 作为 miR-182-5p 海绵在 TNBC 中的生物学功能及调控机制。方法 RT-PCR 技术检测 hsa_circ_USP42 在 TNBC 癌组织及癌旁组织中表达;通过双荧光素酶报告基因分析等技术研究 hsa_circ_USP42 和 miR-182-5p 的相互作用;过表达 hsa_circ_USP42, qPCR 技术及 Western 印迹法检测靶 miRNA miR-182-5p 及靶基因 MTSS1 的表达水平;Transwell 及 CCK8 实验检测 hsa_circ_USP42 对细胞增殖、侵袭和迁移的影响。结果 Hsa_circ_USP42 在 TNBC 中表达明显下调($P=0.000$), 淋巴结阳性组表达低于淋巴结阴性组($P=0.003$)。双荧光素酶实验证实 hsa_circ_USP42 与靶 miR-182-5p 可有效结合;细胞功能实验表明, 过表达 hsa_circ_USP42 可抑制 TNBC 细胞迁移、侵袭和增殖。体外实验表明, 过表达 hsa_circ_USP42 后, 靶 miRNA miR-182-5p 上调, 而靶基因 MTSS1 在转录水平及蛋白水平均降低。结论 Hsa_circ_USP42 在 TNBC 中低表达, 与 miR-182-5p 有效结合, 可发挥 miRNA 海绵上调 MTSS1 表达, 抑制 TNBC 侵袭及转移, 是参与 TNBC 生物学行为机制之一。

【关键词】三阴性乳腺癌; hsa_circ_USP42; miR-182-5p; 转移

【中图分类号】R737.9 **【文献标志码】**A **【文章编号】**1008-0392(2020)02-0205-06

Hsa_circ_USP42 inhibits metastasis in triple negative breast cancer through competitive binding miR-182-5p

YU Jin-ling^{1,2}, GAO Bei-min², SHEN Wei-da², CUI Jing², WANG Hao-feng², ZHU Jiang-fan¹

(1. Dept. of General Surgery, East Hospital, Tongji University School of Medicine, Shanghai 200120, China;

2. Dept. of Breast Surgery, Shanghai Changning Maternity & Infant Health Hospital, Shanghai 200051, China)

【Abstract】Objective To investigate the biological function of hsa_circ_USP42 as sponge of miR-182-5p in triple negative breast cancer (TNBC). **Methods** The expression of hsa_circ_USP42 was detected by qRT-PCR in cancer tissue samples from 30 TNBC patients. Cell migration assay was conducted using Transwell assay, and cell proliferation was evaluated with the Cell Counting Kit 8 (CCK8) in breast cancer MDA-MB-231 cells. Bioinformatics prediction was performed to find the candidate hsa_circ_USP42 that may target miR-182-5p. Luciferase assays using miR-182 5'-untranslated region (5'-UTR) reporters were conducted to confirm the binding of miR-182-5p to the hsa_circ_USP42. Real-time quantitative RT-PCR (qPCR) and Western blotting were used to detect the expression of miR-182-5p and MTSS1 in MDA-MB-231 cells affected by over expression of hsa_circ_USP42. **Results** RT-PCR showed that the expression of hsa_circ_USP42 in TNBC was significantly lower than that in adjacent tissues ($P=0.000$). In vitro experiments showed that overexpression of hsa_circ_USP42 significantly enhanced the proliferation and migration of MDA-MB-231 cells. RT-PCR and

收稿日期: 2019-12-02

基金项目: 上海市长宁区科学技术委员会课题 (CNKW20164Y13)

作者简介: 于金玲 (1976—), 女, 主治医师, 博士研究生. E-mail: yj1152152@163.com

通信作者: 朱江帆. E-mail: jfzjiangfan@163.com

Western blotting analysis showed that overexpression of hsa_circ_USP42 enhanced MTSS1 expression at both mRNA and protein levels, and reduced the expression of miR-182-5p. **Conclusion** The overexpression of hsa_circ_USP42 in TNBC can inhibit cell proliferation and migration, which may be serve as an sponge of miR-182 to enhance expression of MTSS1 that inhibits metastasis of TNBC.

【Key words】 triple-negative breast cancer; hsa_circ_USP42; microRNA-182; migration

目前,乳腺癌仍位居女性恶性肿瘤发病首位^[1]。三阴性乳腺癌(thriple-negative breast cancer, TNBC)是一种特殊类型的乳腺癌亚型,雌激素受体(estrogen receptor, ER)、孕激素受体(progesterone receptor, PR)及人表皮生长因子受体(human epi-dermal growth factor receptor 2, HER2)表达均阴性,缺乏治疗靶点,容易复发及内脏转移,5年生存率不足30%^[2]。除化疗外,尚缺乏其他有效治疗措施。因此,迫切需要寻求新的靶标治疗分子^[3]。环状RNAs(circRNAs)是一类特殊的非编码RNA,具有高度稳定性和组织特异性^[4]。而微小RNA(miRNA)在真核细胞的基因表达、细胞发育分化等发挥重要的调控作用^[5]。近期研究表明,circRNA具有miRNA应答元件(microRNA response elements, MREs),通过与靶miRNA结合,作为miRNAs海绵体,发挥竞争性抑制剂作用,调控相关RNA的表达^[6]。研究发现,miR-182-5p在TNBC中高表达可下调MTSS1水平,促进TNBC转移,并通过高通量测序发现,hsa_circ_USP42在TNBC中差异下调表达;靶miRNA预测软件分析发现,环状RNA hsa_circ_USP42在371~377碱基具有miR-182-5p可能的结合位点^[7]。本研究通过分析 hsa_circ_USP42对TNBC细胞株体外增殖、凋亡的影响,初步探讨circ_USP42靶向结合miR-182-5p在TNBC中发挥的相关分子机制。

1 材料与方法

1.1 一般资料

本研究获得上海长宁区妇幼保健院伦理委员会批准(批准号CNFBLLQKW-2016003)。收集完整的TNBC患者临床及病理资料,并收集石蜡包埋的癌及癌旁组织;纳入患者共30例,为2010年1月至2015年12月期间在上海市长宁区妇幼保健院接受乳腺癌改良根治的患者。所有患者均获得知情同意。患者基线资料:年龄30~70岁,平均(48.67±9.65)岁;绝经18例,未绝经者12例;淋巴结阴性患者9例,淋巴结阳性患者21例;肿瘤病理分期:I期和II期患者共24例,III期患者6例。入选标

准:术前未接受过放疗及化疗,全部标本经两位病理科副主任医师读片,组织病理学确诊浸润性导管癌。有同侧腋窝淋巴结转移1枚以上或者肿瘤直径>5 cm者,术后给予放疗。排除标准:术前接受过放疗及新辅助化疗者;有远处转移患者;特殊病理类型乳腺癌。

1.2 材料与试剂

MDA-MB-231细胞株购于中国上海中科院细胞库;DMEM培养基购于Gibco公司(货号16000-044);LipofectAMINE™3000购于Invitrogen公司(货号L3000015);CCK8试剂购于同仁化工研究所;RNA反转录试剂盒购于TaKaRa公司(货号9109)。

1.3 仪器与设备

CO₂培养箱购于Thermo公司(货号3111);荧光定量PCR仪购自ABI公司(货号ViiA7/7500);RT-PCR反应膜购自ABI(货号4311971);电热恒温水槽购自精宏科技(货号DK-8D);酶标仪购自TECAN公司(M100 PRO);倒置显微镜购于Olympus公司(货号IX73)。

1.4 载体构建和细胞转染

构建带有目的基因 hsa_circ_0007823 circRNA至psiCHECK2载体和pLCDH-ciR载体中。将提取的质粒pUC57-hsa_circ_0007823与载体pLCDH-ciR分别通过EcoRI/BamHI进行双酶切;转化到大肠杆菌,小量提取质粒,进行酶切鉴定,选取酶切正确的质粒进行测序,将测序正确的质粒进行大量提取。

1.5 细胞增殖及迁移实验

1.5.1 CCK8实验 收集细胞,加入适量的新鲜完全培养液轻轻吹打细胞至均匀的细胞悬液,计数,按 1×10^4 /孔的细胞密度将细胞悬液铺于96孔板中,四周用100 μL PBS填充。将铺好的96孔板放于37℃、5% CO₂培养箱培养24 h。实验分为2组,空载转染组和circRNA过表达质粒转染组,每组6复孔。将96板在37℃、5% CO₂培养箱孵育48 h,孵育时间结束,每孔加入10 μL CCK8溶液,将培养板

在培养箱内孵育 2 h, 用酶标仪测定 450 nm 吸光度 (A_{450}), 绘制细胞活力曲线。

1.5.2 细胞迁移实验 细胞转染质粒 24 h 后, 弃去 6 孔板原有培养基, 加胰酶消化细胞, 收集细胞并计数, 用 0.1% BSA 培养基重悬, 细胞密度为 2×10^5 /mL, 取上述细胞悬液 200 μ L 接种于 Transwell 小室中, 下室放置含 2.5% FBS 的培养基, 放置细胞培养箱, 常规培养 24~48 h 后取出, 弃掉上清液, 加入无菌 PBS, 洗 2 次, 室温下用 4% 多聚甲醛固定 10 min, 然后弃除 4% 多聚甲醛, 无菌 PBS 洗 2 次, 室温下再用结晶紫染色 20 min, 用蒸馏水洗掉小室上多余的结晶紫, 室温干燥, 倒置显微镜观察细胞、计数并拍照。

1.5.3 细胞侵袭实验 将人工基质胶 (20 μ g) 包被于 8 μ m 孔径的 Transwell 侵袭小室聚碳酸酯微孔膜的上表面, 置于 37 $^{\circ}$ C 细胞培养箱中静置 30 min, 使其聚成凝胶。收集转染 24 h 后的细胞, 计数, 用 0.1% FBS 的培养液制备成 1×10^6 /mL 细胞悬液, 在 Transwell 上室中加入 200 μ L 细胞悬液, 下室中加入 600 μ L 含 10% FBS 的培养液, 37 $^{\circ}$ C、5% CO_2 细胞培养箱中静置培养 48 h 后取出 Transwell 小室, PBS 润洗, 用棉签去除上室中的基质胶和细胞, 加入 4% 多聚甲醛固定 30 min, PBS 润洗后, 结晶紫室温染色 15 min, 蒸馏水冲洗浸泡, 显微镜下观察拍照。

1.6 双荧光素酶报告基因检测

将 circRNA hsa_circ_USP42 与 hsa-miR-182-5p 的结合位点前后 200 bp 序列克隆构建至报告基因载体 psicheck2, 同时合成上述预测到的 miR-182-5p mimics。收集培养好的 293T 细胞, 用无 PS 的完全培养液重悬细胞, 按每孔 4×10^4 个细胞, 接种至 24 孔板中, 放置细胞培养箱中静置培养过夜。细胞换成无血清培养基 a (3 μ L LipofectamineTM 3000+25 μ L 无血清 OMEM 培养液, 室温静置 5min) 和无血清 OMEM 培养基 b (100 nmol miRNA-182-5p mi-mics/mimic NC+500 ng psicheck2/psicheck2-ciicRN A+25 μ L) 室温静置 5 min。将上述中的 a 和 b 混合, 室温静置 20 min。加入制备的转染混合液于细胞中。去细胞上清液, 加入裂解液充分裂解细胞后, 12 000 $\times$ g 离心 5 min, 取上清液。加入 100 μ L 萤火虫荧光素酶检测试剂, 混匀后测定 RLU (relative light unit)。以报告基因细胞裂解液为空白对照。

1.7 Q-PCR 检测 hsa_circ_USP42 过表达效果及靶 miR-182 基因的表达水平

(1) 收集培养好的 TNBC 细胞 MDA-MB-231, 过表达 hsa_circ_USP42。取处理好的细胞, 用 TRIzol 试剂 (大连宝生物工程有限公司) 提取总 RNA。以 DEPC H₂O 为对照测定 RNA 纯度和定量, 取 2 μ L RNA 溶液, 在酶标仪上测定样本的浓度和质量。

(2) 用 PrimeScriptTM RT Master 试剂盒 (日本 TaKaRa 公司) 按照说明书对总 RNA 进行提取并反转录为 cDNA。qRT-PCR 在 Bio-Rad CFX96 系统 (Bio-Rad 公司) 上使用 TB GreenTM Premix Ex TaqTM (TAKARA 公司) 进行。GAPDH 用作定量 circRNA 和 mRNA 的内部参考, U6 作为 miRNA 的内部参考。结果与计算: 各样品的目标 RNA 和内参分别进行 real-time PCR 反应。基因的相对表达数据采用 $2^{-\Delta\Delta C_t}$ 法进行分析。引物及序列见表 1。

表 1 各基因的引物及引物序列
Tab.1 Primers sequences of each gene

引物名称	引物序列 (5'-3')
hsa-miR-182-5p-RT	GTCGTATCCAGTGCAGGGTCCGAGG-TATTCGCACTGGATACGACAGTGTG
hsa-miR-182-5p-F	GCCTTTGGCAATGGTAGAACT
MTSS1-hF	CAGTCCCAGCTTCGGACAAC
MTSS1-hR	TGAGAGCAGATCCAATCTCCC
hsa-circ-USP42-hF	CTCCAGAATTTGGGCAATA
hsa-circ-USP42-hR	AACCTGCATCCATGTCTCC
U6-hF	CTCGCTTCGGCAGCACA
U6-hR	AACGCTTCACGAATTTGCGT
human-U6-RT	GTCGTATCCAGTGCAGGGTCCGAGG-TATTCGCACTGGATACGACAAAATATG
下游通用引物序列	GTG CAGGGTCCGAGGT
GAPDH-hF	TGACAACCTTTGGTATCGTGGAAGG
GAPDH-hR	AGGCAGGGATGATGTTCTGGAGAG

1.8 Western 印迹法检测蛋白表达水平

RIPA 裂解液裂解细胞, 置于冰上放置 30 min, 4 $^{\circ}$ C, 12 000 $\times$ g 离心 10 min, 取上清液。使用 BCA 试剂盒 (Thermo Fisher Scientific 公司) 测定蛋白浓度。将蛋白液与 loading buffer 混匀, 放入 100 $^{\circ}$ C 水浴 6 min。离心, 放置冰上, 配制 SDS-PAGE 分离胶。将等量的蛋白加载到凝胶上, 电泳后使用转膜仪将蛋白转移到 PVDF 膜上, 然后用 5% 脱脂牛奶在 37 $^{\circ}$ C 封闭 2 h。P 孵育一抗, 内参 (1:5 000), 目的蛋白 (均按 1:1 000 稀释), 4 $^{\circ}$ C, 过夜。孵育二抗 (1:5 000), 37 $^{\circ}$ C, 2 h。化学发光显影 (Millipore ECL 发光液),

记录并拍照。

1.9 统计学处理

采用 GraphPad Prism 7.0 软件作图。采用 SPSS 19.0 软件进行统计分析。定量资料用 $\bar{x} \pm s$ 表示(符合正态分布)或者中位数与四分位数间距(不符合正态分布)的形式表示。组间均值比较使用 *t* 检验。 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 hsa_circ_USP42 在 TNBC 癌组织中低表达

qPCR 结果显示, TNBC 癌组织中 circRNA USP42 相对定量 (5.969 ± 3.076) 低于癌旁组织 (20.284 ± 5.444), 差异有统计学意义 ($t = -16.469, P = 0.000$), 见图 1。circRNA USP42 在淋巴结阳性组表达 (3.575 ± 1.612) 低于淋巴结阴性组 (6.995 ± 2.999), 差异有统计学意义 ($t = 4.039, P = 0.003$)。

2.2 hsa_circ_USP42 过表达抑制 TNBC 细胞迁移和侵袭

过表达质粒 circRNA hsa_circ_USP42 的细胞迁移数量减少 ($P = 0.028$), 过表达质粒 circRNA hsa_circ_USP42 的细胞侵袭数量减少 ($P < 0.0001$), 见图 1。

图 1 circ_USP42 过表达对 TNBC 细胞迁移及侵袭的影响
Fig.1 Effects of circ_USP42 expression on cell migration and invasion of TNBC cells

A: circ_USP42 过表达抑制 TNBC 细胞迁移; B: circ_USP42 过表达抑制 TNBC 细胞侵袭; C: 过表达 circ_USP42 后 TNBC 细胞迁移(上)和细胞侵袭(下)($\times 200$); 与空载组比较, * $P < 0.05$, *** $P < 0.001$

2.3 hsa_circ_USP42 过表达抑制 TNBC 细胞活力

CCK-8 检测结果显示, 过表达质粒 circRNA hsa_circ_USP42 的细胞活力水平降低 ($P = 0.0008$), 见图 2。

2.4 circRNA 结合的 miRNA 荧光素酶筛选验证

通过网络数据库, 预测环状 RNA hsa_circ_USP42 在 371~377 片段有 hsa-miR-182-5p 靶结合点。荧光素酶报告基因实验发现, 将质粒 circRNA

hsa_circ_USP42 与 miR-182-5p mimics 共转染至 TNBC 细胞系 MDA-MB-231, 荧光素酶活性降低, 差异有统计学意义 ($P < 0.0001$) 表明 circRNA circ_USP42 与 miR-182-5p 为有效结合, 见图 3。

图 2 hsa_circ_USP42 过表达对 TNBC 细胞株增殖的影响
Fig.2 Effects of hsa_circ_USP42 expression on cell proliferation of TNBC cells
与空载组比较, *** $P < 0.001$

图 3 荧光素酶报告基因实验结果

Fig.3 The results of luciferase report assay

A: 预测环状 RNA hsa_circ_USP42 与 hsa-miR-182-5p 靶结合位点; B: 双荧光素酶验证 hsa_circ_USP42 与 miR-182 有效结合与对照组比较, *** $P < 0.001$

2.5 circRNA-miRNA-靶基因验证

在 MDA-MB-231 中过表达环状 RNA hsa_circ_USP42, qPCR 验证 miR-182 及 MTSS1 靶基因表达水平, Western 印迹法检测 MTSS1 的蛋白表达水平。qPCR 结果表明, 与对照组比较, 过表达质粒 circRNA hsa_circ_USP42 转染细胞后, circRNA hsa_circ_USP42 的表达水平升高 ($P = 0.0022$); miR-182-5p 的表达水平降低 ($P = 0.036$), MTSS1 的表达水平升高 ($P = 0.0017$), 差异均有统计学意义, 见图 4。

Western 印迹法检测结果显示, 过表达质粒 circRNA hsa_circ_USP42 细胞的 MTSS1 蛋白表达水平升高, 差异有统计学意义 ($P = 0.0354$), 见图 5。

图4 hsa_circ_USP42 过表达后 miR-182-5p 及 MTSS1 mRNA 水平变化

Fig.4 The expression of miR-182-5p and MTSS1 mRNA in hsa_circ_USP42 overexpression cells

与对照组比较, * $P < 0.05$, ** $P < 0.01$

图5 hsa_circ_USP42 过表达后 MTSS1 蛋白水平变化及灰度分析

Fig.5 The expression of MTSS1 protein and gray value in hsa_circ_USP42 overexpression cells

A: MTSS1 蛋白水平变化; B: 灰度分析; 与对照组比较, * $P < 0.05$

3 讨论

TNBC 是一类具有高度异质性的乳腺癌, 严重危害女性健康。15%~20% 的乳腺癌患者为 TNBC^[8]。在过去的几十年中, 乳腺癌治疗取得了显著进展, 总体死亡率下降。然而, TNBC 病理组织学分级差, 肿瘤侵袭性强, 容易发生内脏转移。目前 TNBC 治疗仍以化疗为主, 尚缺乏内分泌及抗 HER2 治疗靶点, 3 年后复发率可达 40%~50%^[9], 预后仍然很差。因此, 鉴定更多用于治疗 TNBC 的抗癌分子靶标具有重要意义。

CircRNA 是一类以共价闭环为特征的非编码 RNA, 广泛存在于真核生物中, 来源于基因的外显子或内含子, 具有物种保守性及组织特异性。随着高通量测序技术和计算分析的发展, 越来越多的 circRNA 被发现, 其在疾病发生中的调控作用也越来越被重视^[10]。相比线性 RNA 分子, circRNA 具有封闭的环状结构, 没有 5'-3' 的极性和 polyA 尾巴, 因此不容易被 RNA 核酸外切酶或者 RNaseR 降

解, 更稳定^[11]。大多 circRNAs 来源于外显子, 具有可以结合 miRNA 的 MREs。circRNAs 主要存在于细胞质中, 其表达丰度较高, 具有组织特异性, 相对保守。circRNAs 的上述特性决定了它们在转录后的重要作用, 可作为疾病诊断及治疗的潜在靶点。

CircRNA 可作为内源性竞争 RNA (ceRNA) 分子, 可能通过影响靶 miRNA 与下游靶 mRNA 结合而发挥作用^[12]。有研究证明, 在不同物种中, circRNA 可以发挥 miRNA 海绵体的作用, 通过与 miRNA 竞争性结合, 作为 ceRNA, 调控靶 mRNA 的表达^[13-14], 在疾病调控中发挥重要作用, 作为潜在的疾病预后因子及治疗靶点^[15]。约 30% 以上的 circRNA 发挥 miRNA 的 ceRNA 作用, 形成 circRNA-miRNA-mRNA 多维调控网络, 调控基因的表达。Piwecka 等^[16]验证了环状 RNA Cdr1as 大约有 1 500 个核苷酸, 可能发挥海绵作用吸附 miRNA 的作用。

microRNA 是较短的 RNA 分子, 通常结合到 mRNA 的互补序列上, 因而控制着细胞产生的特定蛋白数量, 发挥抑癌或促癌作用^[17-18]。研究探索了 miR-182 对 TNBC 细胞行为的作用, 表明 miR-182 在 TNBC 组织和细胞中上调, 可促进 TNBC 细胞的增殖和侵袭, 并证明 miR-182 可能通过下调靶 mRNA 表达促进 TNBC 细胞增殖和迁移^[19-20]。本课题组前期进行了 TNBC circRNA 测序, 建立了 circRNA 差异表达谱, 挑选出差异表达显著的 circ_USP42 作为进一步研究对象。靶 miRNA 预测结果表明, miR-182-5p 是与 hsa-circ-USP42 结合力最强的 5 个 miRNA 之一。进一步通过数据库预测 hsa_circ_USP42 在 371~377 及 412~419 两个碱基序列与 miR-182-5p 有潜在结合位点。荧光素酶报告基因质粒 circRNA hsa_circ_USP42 与 has-mir-182-5p 共转染至细胞后荧光素酶活性显著降低, 说明 circRNA circ_USP42 与 miR-182 有效结合。在本研究中, hsa_circ_USP42 在 TNBC 癌组织中的表达明

显低于癌旁组织;在 TNBC 淋巴结阳性组表达更低。在 TNBC 细胞株 MDA-MB-231 中过表达 hsa_circ_USP42,细胞的侵袭和迁移明显受到抑制,提示 hsa_circ_USP42 可能发挥 miR-182-5p 的海绵调控作用,影响 TNBC 的发生发展。荧光素酶报告基因实验证实 hsa_circ_USP42 与 miR-182-5p 有效结合;过表达 hsa_circ_USP42 后,靶 miRNA miR-182-5p 显著下调,而靶基因 MTSS1 在转录水平及蛋白水平均升高,提示 hsa_circ_USP42 可能发挥 miR-182-5p 海绵作用,上调 MTSS1 表达,抑制 TNBC 侵袭及转移,在 TNBC 发生发展过程中发挥抑癌作用;hsa_circ_USP42 与 miR-182-5p 的靶结合位点可能是 TNBC 的潜在治疗靶点。

未来需要体内动物实验进一步阐明 hsa_circ_USP42 作为 miR-182-5p 海绵调控体内机制。hsa_circ_USP42/miR-182-5p/MTSS1 轴对 TNBC 复发、转移的影响,有待进一步研究。

【参考文献】

[1] BRAY F, FERLAY J, SOERJOMATARAM I, et al. Global cancer statistics 2018; GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries [J]. CA Cancer J Clin, 2018, 68(6): 394 - 424.

[2] DOEPKER M P, HOLT S D, DURKIN M W, et al. Triple-negative breast cancer: a comparison of race and survival [J]. Am Surg, 2018, 84(6): 881 - 888.

[3] PARK J H, AHN J H, KIM S B. How shall we treat early triple-negative breast cancer (TNBC): from the current standard to upcoming immuno-molecular strategies [J]. ESMO Open, 2018, 3(Suppl 1): e000357.

[4] MEMCZAK S, JENS M, ELEFSINIOTI A, et al. Circular RNAs are a large class of animal RNAs with regulatory potency [J]. Nature, 2013, 495(7441): 333 - 338.

[5] NIGRO J M, CHO K R, FEARON E R, et al. Scrambled exons [J]. Cell, 1991, 64(3): 607 - 613.

[6] HANSEN T B, JENSEN T I, CLAUSEN B H, et al. Natural RNA circles function as efficient microRNA sponges [J]. Nature, 2013, 495(7441): 384 - 388.

[7] 于金玲,沈卫达,高蓓敏,等.miR-182 下调 MTSS1 表达促进三阴性乳腺癌侵袭及转移.[J].医学研究生学报,2019,32(9): 963 - 967.

[8] BARECHE Y, VENET D, IGNATIADIS M, et al. Unravelling triple-negative breast cancer molecular het-

erogeneity using an integrative multiomic analysis [J]. Ann Oncol, 2018, 29(4): 895 - 902.

[9] BIANCHINI G, BALKO J M, MAYER I A, et al. Triple-negative breast cancer: challenges and opportunities of a heterogeneous disease [J]. Nat Rev Clin Oncol, 2016, 13(11): 674 - 690.

[10] OJHA R, NANDANI R, CHATTERJEE N, et al. Emerging role of circular RNAs as potential biomarkers for the diagnosis of human diseases [J]. Adv Exp Med Biol, 2018, 1087: 141 - 157.

[11] LI Y, ZHENG Q P, BAO C Y, et al. Circular RNA is enriched and stable in exosomes: a promising biomarker for cancer diagnosis [J]. Cell Res, 2015, 25(8): 981 - 984.

[12] SALMENA L, POLISENO L, TAY Y, et al. A Cerna hypothesis: the Rosetta Stone of a hidden RNA language? [J]. Cell, 2011, 146(3): 353 - 358.

[13] YANG R, XING L, ZHENG X Y, et al. The circRNA circAGFG1 acts as a sponge of miR-195-5p to promote triple-negative breast cancer progression through regulating CCNE1 expression [J]. Mol Cancer, 2019, 18(1): 4.

[14] ZHENG Q P, BAO C Y, GUO W J, et al. Circular RNA profiling reveals an abundant circHIPK3 that regulates cell growth by sponging multiple miRNAs [J]. Nat Commun, 2016, 7: 11215.

[15] WENG W H, WEI Q, TODEN S, et al. Circular RNA ciRS-7-A promising prognostic biomarker and a potential therapeutic target in colorectal cancer [J]. Clin Cancer Res, 2017, 23(14): 3918 - 3928.

[16] PIWECKA M, GLAŽAR P, HERNANDEZ-MIRANDA L R, et al. Loss of a mammalian circular RNA locus causes miRNA deregulation and affects brain function [J]. Science, 2017, 357(6357): eaam8526.

[17] BHARDWAJ A, SINGH H, RAJAPAKSHE K, et al. Regulation of miRNA-29c and its downstream pathways in preneoplastic progression of triple-negative breast cancer [J]. Oncotarget, 2017, 8(12): 19645 - 19660.

[18] 周春,王光华,张帮柱.miR-367 对人乳腺癌 MCF-7 细胞增殖、侵袭和迁移的影响及其机制 [J]. 吉林大学学报(医学版), 2019, 45(6): 1353 - 1360.

[19] 于金玲,沈卫达,高蓓敏,等.MiR-182/FOXF2 信号通路在三阴性乳腺癌侵袭及血管生成中的意义 [J]. 同济大学学报(医学版), 2018, 39(1): 54 - 58.

[20] YU J, SHEN W, GAO B, et al. MicroRNA-182 targets FOXF2 to promote the development of triple-negative breast cancer [J]. Neoplasma, 2017, 64(2): 209 - 215.