doi: 10.16118/j.1008-0392.2020.04.009

· 临床研究 ·

上海市体检人群代谢健康型超重和肥胖 检出率及其5年随访分析

江浩^{1,2}, 蒋晓敏¹, 沈秀华², 万燕萍¹, 范竹萍³, 徐仁应¹

(1. 上海交通大学医学院附属仁济医院临床营养科, 上海 200127; 2. 上海交通大学医学院营养系, 上海 200025;
3. 上海交通大学医学院附属仁济医院消化科, 上海 200127)

【摘要】目的 研究体检人群中代谢健康型超重和肥胖检出率及5年随访期间内代谢健康型超重和肥胖的演变情况。**方法** 以2013—2018年间在上海交通大学医学院附属仁济医院体检中心进行体检的人群作为研究对象。采集身高、体重并计算BMI, 测量血压, 收集糖代谢指标、脂代谢指标、超敏C反应蛋白、血清尿酸和肝脏B超结果。代谢健康型定义为血压、糖代谢、脂代谢、血清尿酸均正常且无脂肪肝。所有代谢健康型人群进一步根据基线时(2013年)BMI分为体重和代谢均正常、代谢健康型超重和代谢健康型肥胖3组。**结果** 共64 164人(男性38 134人, 女性26 030人)纳入本研究。平均年龄(42.0±12.0)岁, BMI为(23.8±3.2) kg/m²。本组人群中代谢健康型检出率28.7%(18 448人), 其中代谢和BMI均正常占78.9%、代谢健康型超重占19.0%, 代谢健康型肥胖2.1%。5年随访期间内, 代谢健康型的人群中共9 318人转变为代谢不健康型(50.5%)。在控制多种混杂因素后, 与体重和代谢均正常的人群相比, 代谢健康型超重和代谢健康型肥胖的人群转化为代谢不健康型的危险性分别增加11.0%(HR=1.11; 95%CI: 1.05~1.18)和16.0%(HR=1.16; 95%CI: 1.01~1.33)。**结论** 代谢健康型超重和肥胖的合计检出率为6.1%。与代谢和BMI均正常的人群相比, 代谢健康型超重和肥胖转化为不健康的危险性显著增加。

【关键词】 代谢健康型; 超重; 肥胖; 代谢不健康型; 随访研究

【中图分类号】 R589 **【文献标志码】** A **【文章编号】** 1008-0392(2020)04-0454-06

Prevalence of metabolically healthy overweight/obesity in health check-up population: a five-year follow-up

JIANG Hao^{1,2}, JIANG Xiao-min¹, SHEN Xiu-hua², WAN Yan-ping¹,
FAN Zhu-ping³, XU Ren-ying¹

(1. Dept. of Clinical Nutrition, Renji Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200127, China;

2. Dept. of Nutrition, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200025, China;

3. Dept. of Gastroenterology, Renji Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200127, China)

【Abstract】Objective To evaluate the prevalence of metabolically healthy overweight and obesity in health check-up population and the risk of developing metabolically unhealthy status in five years.

Methods Participants were recruited from people undergoing health check-up in Healthy Management Center, Renji Hospital, School of medicine, Shanghai Jiao Tong University from 2013 to 2018. The information of age, sex, height, body weight, BMI, blood pressure, glucose parameters, lipid profile, serum uric acid, and liver echography were collected. Metabolically healthy was defined as subjects with normal blood pressure, glucose parameters, lipid profile, high sensitivity C-reactive protein (hs-CRP), uric acid level, and without fatty liver. Participants with metabolically healthy were

收稿日期: 2020-02-04

作者简介: 江浩(1998—), 男, 学士. E-mail: 798425084@qq.com

通信作者: 徐仁应. E-mail: xurenying7465@126.com

further classified into three groups based on baseline BMI: metabolically healthy and normal BMI, metabolically healthy overweight, and metabolically healthy obesity. **Results** A total of 64 164 participants (38 134 males and 26 030 females) were included in the study. The average age and BMI was 42.0 ± 12.0 years and 23.8 ± 3.2 kg/m², respectively. The prevalence of overall metabolically healthy was 28.7% (18 448/64 164); metabolically healthy and normal BMI (78.9%), metabolically overweight (19.0%), and metabolically healthy obesity (2.1%). During five years of follow-up, 9 318 out of 18 448 metabolically healthy subjects (50.5%) were converting to metabolically unhealthy. Compared with participants whose BMI and metabolic status were normal, metabolically healthy overweight and obesity participants were associated with 11.0% (HR = 1.11; 95% CI: 1.05 – 1.18) and 16.0% (HR = 1.16; 95% CI: 1.01 – 1.33) increasing risk of converting to metabolically unhealthy status after adjusting for a series of potential confounders. **Conclusion** The overall prevalence of metabolically overweight and obesity was 6.1% in this healthy check-up population. Compared with subjects whose BMI and metabolic status were normal, metabolically healthy overweight and obesity subjects are associated with a increasing risk of converting to metabolically unhealthy status.

【Key words】 metabolically healthy phenotype; overweight; obesity; metabolically unhealthy phenotype; cohort study

代谢健康型超重和肥胖 (metabolically healthy overweight and obesity) 指个体体重虽然处于异常状态,但代谢指标仍处于正常范围。以往研究报道表明代谢健康型超重和肥胖检出率约为 10% ~ 40%^[1]。代谢健康型超重和肥胖是否会增加代谢性疾病的风险存在巨大争议。部分研究表明代谢健康型超重和肥胖仍然会增加心脑血管疾病和其他不良临床结局的风险^[2-6]; 而另一些研究则表明,代谢健康型超重和肥胖与心脑血管疾病和全因死亡率之间无明显关联^[7-8]。因此,本研究在中国体检人群中分析代谢健康型超重和肥胖检出率,并在 5 年的随访中观察代谢健康人群的演变。

1 资料与方法

1.1 研究对象

所有研究对象均来自于 2013 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日上海交通大学医学院附属仁济医院体检中心。纳入标准: (1) 基线数据完整; (2) 无代谢性疾病病史; (3) 5 年随访期间随访次数 ≥ 2 次。排除标准: (1) 基线数据缺失 (81 292 人); (2) 有代谢性疾病病史 (20 770 人); (3) 5 年随访期间随访次数 < 2 次 (62 081 人)。鉴于营养不良对代谢性疾病的影响与超重和肥胖截然不同,进一步排除了基线体重过低/营养不良的人群 (BMI ≤ 18.4 kg/m², 5 141 人)^[9]。最终 64 164 人 (男 38 134 人,女 26 030 人) 纳入本次研究。进一步对 18 448 名代谢健康型人

群进行了 5 年随访,见图 1。

图1 样本筛选过程

Fig.1 The process of sample recruitment

1.2 指标采集

采集的指标如下。(1) 身高、体重: 脱鞋和外套后采用 SK-CK 超声波体检机 (江苏衡峰衡器有限公司, 江苏盐城) 测量身高和体重。身高精确至 0.1 cm, 体重精确至 0.5 kg。BMI = kg/m²。(2) 血压: 静坐 5 min 后采用欧姆龙全自动血压计测量左臂血压。血压测量 2 次, 取平均值记录。2 次血压平均测量值 $\geq 130/80$ mmHg (1 mmHg = 0.133 kPa) 为血压异常^[10]。(3) 血生化指标: 禁食 6 h 后清晨抽取静脉血 5 mL, 测量空腹血糖、糖化血红蛋白、空腹胰

胰岛素、总胆固醇、血清三酰甘油、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、超敏 C 反应蛋白 (high sensitivity C-reactive protein, hsCRP)、血清尿酸。所有测量均由上海交通大学医学院附属仁济医院检验中心完成。(4) 脂肪肝: 根据肝脏 B 超评判是否存在脂肪肝^[11]。(5) 代谢性疾病既往史: 采用问卷调查, 由体检者本人填写完成。

1.3 MHO 筛查标准

采用本课题组以往使用的标准, 代谢健康型界定: (1) 血糖 < 5.6 mmol/L 或化血红蛋白 < 5.7%; (2) 血压 < 130/80 mmHg; (3) 血清三酰甘油 < 1.7 mmol/L; (4) 高密度脂蛋白男性 ≥ 0.9 mmol/L, 女性 ≥ 1.0 mmol/L; (5) 低密度脂蛋白 < 3.4 mmol/L; (6) 总胆固醇 < 5.72 mmol/L; (7) 尿酸值 < 416 μmol/L (男性) 或 < 357 μmol/L (女性); (8) 无脂肪肝。以上任一项指标异常或具有脂肪肝则为代谢不健康型^[12]。

根据中国成年人超重和肥胖的诊断标准^[13] 进一步将代谢健康型分 3 组: 代谢及 BMI 均正常 (18.5 kg/m² ≤ BMI < 24.0 kg/m²)、代谢正常型超重

(24.0 kg/m² ≤ BMI < 28.0 kg/m²)、代谢健康型肥胖 (BMI ≥ 28.0 kg/m²)。

1.4 统计学处理

所有统计均采用 SAS9.4 完成。计量资料采用 $\bar{x} \pm s$ 表示, 组间比较采用非配对 *t* 检验进行分析; 计数资料采用百分比表示, 组间比较采用 χ^2 检验。代谢健康向代谢不健康转变的危险性采用 Cox 回归模型, 并控制相关混杂因素。各项基线临床指标对代谢健康型向代谢性不健康型转化的作用分析通过下列公式进行计算: (因素纳入前 HR 值 - 因素纳入后 HR 值) / (因素纳入前 HR 值 - 1) × 100%^[14]。P < 0.05 为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 一般情况

本组人群平均年龄 (42.0 ± 12.0) 岁, BMI 为 (23.8 ± 3.2) kg/m²。男性年龄和 BMI 均明显高于女性, 其他各项指标男女之间差异也均有统计学意义 (P < 0.01), 见表 1。

表 1 研究人群基线数据比较
Tab.1 Baseline characteristics of participants

参数	男性	女性	P	总体
年龄/岁	42.8 ± 12.3	41.0 ± 11.4	<0.001	42.0 ± 12.0
BMI/(kg · m ⁻²)	24.7 ± 3.1	22.6 ± 3.1	<0.001	23.8 ± 3.2
收缩压/mmHg	123.9 ± 15.8	116.7 ± 15.7	<0.001	121.0 ± 16.2
舒张压/mmHg	77.2 ± 12.1	70.9 ± 9.9	<0.001	74.7 ± 11.7
空腹血糖/(mmol · L ⁻¹)	5.3 ± 1.0	5.0 ± 0.7	<0.001	5.2 ± 0.9
糖化血红蛋白 (%)	5.4 ± 0.7	5.3 ± 0.5	<0.001	5.4 ± 0.6
总胆固醇/(mmol · L ⁻¹)	4.9 ± 0.9	4.9 ± 0.9	<0.001	4.9 ± 0.9
三酰甘油/(mmol · L ⁻¹)	1.7 ± 1.3	1.1 ± 0.7	<0.001	1.4 ± 1.2
低密度脂蛋白/(mmol · L ⁻¹)	3.0 ± 0.7	2.8 ± 0.8	<0.001	2.9 ± 0.8
高密度脂蛋白/(mmol · L ⁻¹)	1.2 ± 0.3	1.5 ± 0.3	<0.001	1.4 ± 0.3
尿酸/(μmol · L ⁻¹)	364.7 ± 78.1	269.3 ± 55.2	<0.001	326.0 ± 84.0

2.2 总人群检出率

本组人群中代谢健康型人群检出率为 28.7% (18 448 人), 其中代谢和 BMI 均正常 14 563 人 (78.9%)、代谢健康型超重 3 507 人 (19.0%), 代谢健康型肥胖 378 人 (2.1%)。按照年龄和性别进行亚组分析, 女性代谢健康型超重和肥胖的检出率均明显高于男性 (女性 6.3%, 男性 5.9%), 而成年人代谢健康型超重和肥胖检出率则高于老年人群 (≥ 60 岁), 见图 2。

2.3 代谢健康型向代谢不健康型转化的风险

5 年随访期间, 代谢健康型人群中 9 318 人转化为代谢不健康型 (50.5%)。转化为代谢不健康型的人群中男性更多、年龄更大、BMI、血压、血糖和脂代谢指标更高, 见表 2。与体重和代谢均正常组的人群相比, 在控制多种混杂因素后, 代谢健康型超重和代谢健康型肥胖的人群转化为代谢不健康型的危险性分别增加 11.0% (HR = 1.11; 95% CI: 1.05 ~ 1.18) 和 16.0% (HR = 1.16; 95% CI: 1.01 ~ 1.33), 见表 3。

图 2 不同性别和年龄代谢健康型超重和肥胖检出率

Fig.2 The prevalence of metabolically healthy overweight and obesity stratified by sex and age

G1: 代谢和 BMI 均正常;G2: 代谢健康型超重;G3: 代谢健康型肥胖

表 2 维持代谢健康状态和转变为不健康状态两组人群基线数据比较

Tab.2 Baseline characteristics between participants remaining metabolically healthy and those converted to metabolically unhealthy

参数	维持代谢健康 (n=9 130)	转变为代谢不健康 (n=9 138)	P
年龄/岁	34.3±8.4	37.9±10.6	<0.001
男/女 (%)	28.6/71.4	46.7/53.3	<0.001
BMI/(kg·m ⁻²)	21.7±3.2	22.6±2.5	<0.001
收缩压/mmHg	107.2±9.6	111.3±9.5	<0.001
舒张压/mmHg	66.0±6.8	68.7±6.8	<0.001
空腹血糖/(mmol·L ⁻¹)	4.8±0.3	4.8±0.4	<0.001
糖化血红蛋白 (%)	5.1±0.3	5.2±0.3	<0.001
总胆固醇/(mmol·L ⁻¹)	4.3±0.6	4.5±0.6	<0.001
三酰甘油/(mmol·L ⁻¹)	0.8±0.3	0.9±0.3	<0.001
低密度脂蛋白/(mmol·L ⁻¹)	2.3±0.5	2.5±0.5	<0.001
高密度脂蛋白/(mmol·L ⁻¹)	1.5±0.3	1.5±0.3	<0.001
尿酸/(μmol·L ⁻¹)	272.5±56.4	295.1±60.9	<0.001

表 3 18 448 名代谢健康型人群转化为代谢不健康型的风险: Cox 回归结果

Tab.3 The risk for the conversion from metabolically healthy to unhealthy status: the results of Cox regression

项目	代谢及 BMI 均正常	代谢健康型超重	代谢健康型肥胖	趋势 P
样本数	14 563	3 507	378	—
转化数	6 777	2 263	278	—
模型 1	参照(1.0)	1.36(1.29~1.42)	1.63(1.45~1.84)	<0.001
模型 2	参照(1.0)	1.13(1.07~1.19)	1.17(1.03~1.32)	<0.001
模型 3	参照(1.0)	1.11(1.05~1.18)	1.16(1.01~1.33)	<0.001

模型 1 控制基线年龄和性别;模型 2 控制模型 1 中的变量及基线收缩压、舒张压、空腹血糖、糖化血红蛋白、血清三酰甘油、总胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、血清尿酸水平;模型 3 控制模型 2 中的变量及基线超敏 C 反应蛋白

进一步分析各基线临床指标对代谢健康型向不健康型转化的作用,发现 4 项脂代谢指标合计的作用最强(36.3%),其次为血压指标(24.3%)和血尿酸指标(12.9%),糖代谢指标的作用最弱(10.2%)。

3 讨 论

在 64 164 名中体检人群中,代谢健康型人群检出率为 28.7%。代谢健康型超重和代谢健康型肥胖合计检出率为 6.1%。总体而言,代谢健康型超重和

肥胖的检出率女性高于男性,成年人高于老年人。本研究的筛查标准较以往研究^[15]使用的筛查标准更严格,因而检出率也更低。

虽然大多数的研究显示肥胖个体容易发生高血压、糖尿病、脑卒中、脂代谢紊乱及某些类型的肿瘤,但仍有部分研究显示不是所有的肥胖个体都并发上述疾病^[2-6]。这部分特殊的肥胖患者虽然体重已经超出正常值,但仍然可能具有正常的血压、血糖及胰岛素敏感性,因而被称为代谢健康型超重和肥胖。代谢

健康型超重和肥胖的概念最早见于 1982 年^[16]。代谢健康型超重和肥胖研究领域目前存在很多争议,其主要问题:(1) 具有代谢健康型超重和肥胖的个体是否会增加死亡率和代谢性疾病发生的风险^[2-8];(2) 代谢健康型超重和肥胖是否稳定或转化为代谢不健康型^[17];(3) 哪些因素促进代谢健康型超重和肥胖的个体向代谢不健康型进行转化^[18]。

5 年随访期间,代谢健康的人群中共 9 318 人转变为代谢不健康型(50.5%)。与本研究结果相一致,一项随访研究样本来自于“护士健康研究”,结果显示 84% 的代谢健康型肥胖受试者在 20 年的随访期间转变为代谢不健康型^[18]。但该研究纳入的研究对象均为女性。促使代谢健康型向代谢不健康型的转化的危险因素,目前尚不清晰。本研究发现与代谢和 BMI 均正常的人群相比,在控制多种混杂因素后,代谢健康型超重和代谢健康型肥胖的人群转化为代谢不健康型的危险性显著增加。Moussa 等^[17]的研究也显示基线 BMI 越高,维系代谢健康的时间越短。Hamer 等^[19]的研究也显示较体重正常的代谢健康型人群相比,代谢健康型肥胖的人群转变为代谢不健康型的概率增加 4 倍。在促进转化的因素中,脂代谢指标的作用最强,而糖代谢指标(空腹血糖和糖化血红蛋白)的作用最弱。

除研究设计、研究人群、样本量和随访时间的差异外,代谢健康型超重和肥胖相关研究中导致各种差异的最重要原因是缺乏统一的筛查标准^[15]。代谢健康型超重和肥胖的筛查标准多借鉴代谢综合征的诊断:高血压、糖尿病、脂代谢紊乱(总胆固醇和低密度脂蛋白)。部分研究在代谢综合征的基础上增加了胰岛素抵抗的评判标准^[20-22]。但将具有一项代谢指标异常(如具有单项血糖或血压异常的人群)仍然划分为代谢健康人群^[20-21],这可能导致代谢健康型超重和肥胖相关的研究结果遭到质疑。文献显示血糖或血压出现异常的人群,会明显增加心血管疾病的风险^[23-24]。除此之外,脂肪肝和尿酸水平虽然没有被纳入代谢综合征的诊断,但由于他们和代谢性疾病关系密切^[25-26],中华医学会糖尿病分会将这两者视为代谢综合征的临床表现^[27]。

本研究仍有一定的缺陷,比如研究人群来自于单中心,样本代表性受到影响。其次,本研究没有考虑随访期间内代谢状态的变化以及人群抽烟、饮酒、运动等生活习惯对代谢健康型超重和肥胖发生的影响,而这些数据均可能影响代谢性疾病的发生^[28-31]。

不同代谢健康型超重和肥胖的筛查标准使有关这一肥胖亚型的研究存在很多争议。解决这些争议的关键之一在于制定代谢健康型超重和肥胖的统一的筛查标准。筛查标准的确立对于代谢健康型超重和肥胖的研究以及代谢健康型超重和肥胖的转归有着重要意义。未来需要更多设计良好、研究样本更具代表性的多中心研究来验证研究结果,从而为制定统一的标准提供理论基础。

【参考文献】

- [1] PRIMEAU V, CODERRE L, KARELIS A D, et al. Characterizing the profile of obese patients who are metabolically healthy[J]. *Int J Obes (Lond)*, 2011, 35(7): 971-981.
- [2] HINNOUHO G M, CZERNICHOW S, DUGRAVOT A, et al. Metabolically healthy obesity and risk of mortality: does the definition of metabolic health matter? [J]. *Diabetes Care*, 2013, 36(8): 2294-2300.
- [3] HINNOUHO G M, CZERNICHOW S, DUGRAVOT A, et al. Metabolically healthy obesity and the risk of cardiovascular disease and type 2 diabetes: the Whitehall II cohort study[J]. *Eur Heart J*, 2015, 36(9): 551-559.
- [4] CALEYACHETTY R, THOMAS G N, TOULIS K A, et al. Metabolically healthy obese and incident cardiovascular disease events among 3.5 million men and women [J]. *J Am Coll Cardiol*, 2017, 70(12): 1429-1437.
- [5] KRAMER C K, ZINMAN B, RETNAKARAN R. Are metabolically healthy overweight and obesity benign conditions? A systematic review and meta-analysis [J]. *Ann Intern Med*, 2013, 159(11): 758-769.
- [6] ZHENG R Z, ZHOU D, ZHU Y M. The long-term prognosis of cardiovascular disease and all-cause mortality for metabolically healthy obesity: a systematic review and meta-analysis [J]. *J Epidemiol Community Health*, 2016, 70(10): 1024-1031.
- [7] MEIGS J B, WILSON P W F, FOX C S, et al. Body mass index, metabolic syndrome, and risk of type 2 diabetes or cardiovascular disease [J]. *J Clin Endocrinol Metab*, 2006, 91(8): 2906-2912.
- [8] ST-PIERRE A C. Insulin resistance syndrome, body mass index and the risk of ischemic heart disease [J]. *Can Med Assoc J*, 2005, 172(10): 1301-1305.
- [9] 蒋朱明,于康,朱赛楠,姚晨,中小医院营养风险筛查和营养支持应用调查研究协作组.我国东、中、西部中小医院住院患者营养不良(不足)、营养风险、超重和

- 肥胖发生率及营养支持应用状况调查(中期小结)[J].中国临床营养杂志,2008,16(06):338-340.
- [10] WHELTON P K, CAREY R M, ARONOW W S. ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association. Task force on clinical practice guidelines[J]. Kidneys, 2018,7(1):68-74.
- [11] 中华医学会肝病学会脂肪肝和酒精性肝病学组,中国医师协会脂肪性肝病专家委员会.酒精性肝病防治指南(2018年新版)[J].实用肝脏病杂志,2018,21(2):170-176.
- [12] XU R Y, GAO X, WAN Y P, et al. Association of metabolically healthy overweight phenotype with abnormalities of glucose levels and blood pressure among Chinese adults[J]. JAMA Netw Open, 2019,2(10):e1914025.
- [13] 中国肥胖问题工作组数据汇总分析协作组.我国成人体重指数和腰围对相关疾病危险因素异常的预测价值:适宜体重指数和腰围切点的研究[J].中华流行病学杂志,2002,23(1):10-15.
- [14] LEE C Y, LIN W T, TSAI S, et al. Association of parental overweight and cardiometabolic diseases and pediatric adiposity and lifestyle factors with cardiovascular risk factor clustering in adolescents [J]. Nutrients, 2016,8(9):E567.
- [15] JUNG C H, LEE W J, SONG K H. Metabolically healthy obesity: a friend or foe? [J]. Korean J Intern Med, 2017,32(4):611-621.
- [16] KISSEBAH A H, VYDELINGUM N, MURRAY R, et al. Relation of body fat distribution to metabolic complications of obesity [J]. J Clin Endocrinol Metab, 1982,54(2):254-260.
- [17] MOUSSA O, ARHI C, ZIPRIN P, et al. Fate of the metabolically healthy obese—Is this term a misnomer? A study from the Clinical Practice Research Datalink [J]. Int J Obes (Lond), 2019,43(5):1093-1101.
- [18] ECKEL N, LI Y P, KUXHAUS O, et al. Transition from metabolic healthy to unhealthy phenotypes and association with cardiovascular disease risk across BMI categories in 90 257 women (the Nurses' Health Study): 30 year follow-up from a prospective cohort study[J]. Lancet Diabetes Endocrinol, 2018,6(9):714-724.
- [19] HAMER M, BELL J A, SABIA S, et al. Stability of metabolically healthy obesity over 8 years: the English Longitudinal Study of Aging [J]. Eur J Endocrinol, 2015,173(5):703-708.
- [20] WILDMAN R P, MUNTNER P, REYNOLDS K, et al. The obese without cardiometabolic risk factor clustering and the normal weight with cardiometabolic risk factor clustering: prevalence and correlates of 2 phenotypes among the US population (NHANES 1999—2004) [J]. Arch Intern Med, 2008,168(15):1617-1624.
- [21] SHIN M J, HYUN Y J, KIM O Y, et al. Weight loss effect on inflammation and LDL oxidation in metabolically healthy but obese (MHO) individuals: low inflammation and LDL oxidation in MHO women [J]. Int J Obes (Lond), 2006,30(10):1529-1534.
- [22] LYNCH L A, O'CONNELL J M, KWASNIK A K, et al. Are natural killer cells protecting the metabolically healthy obese patient? [J]. Obesity (Silver Spring), 2009,17(3):601-605.
- [23] BALAKUMAR P, MAUNG-U K, JAGADEESH G. Prevalence and prevention of cardiovascular disease and diabetes mellitus [J]. Pharmacol Res, 2016,113:600-609.
- [24] BUNDY J D, HE J. Hypertension and related cardiovascular disease burden in China [J]. Ann Glob Health, 2016,82(2):227-233.
- [25] 朱国英,黄东平,方青,等.脂肪肝和脂肪胰患者营养状态差异的研究[J].同济大学学报(医学版),2019,40(2):213-217.
- [26] 宋瑞,刘弋维,李雪媛,等.超重或肥胖人群动脉僵硬度与心血管疾病危险因素的相关性研究[J].同济大学学报(医学版),2014,35(3):51-54,77.
- [27] 中华医学会糖尿病分会代谢综合征研究协作组.中华医学会糖尿病分会关于代谢综合征的建议[J].中华糖尿病杂志,2004,12(3):5-10.
- [28] DING L, XU Y, WANG L M, et al. Smoking and its relation to metabolic status among Chinese adults: analysis of a nationwide survey [J]. Biomed Environ Sci, 2016,29(9):619-627.
- [29] FRAGOPOULOU E, CHOLEVA M, ANTONOPOULOU S, et al. Wine and its metabolic effects. A comprehensive review of clinical trials [J]. Metab Clin Exp, 2018,83:102-119.
- [30] ZANUSO S, SACCHETTI M, SUNDBERG C J, et al. Exercise in type 2 diabetes: genetic, metabolic and neuromuscular adaptations. A review of the evidence [J]. Br J Sports Med, 2017,51(21):1533-1538.
- [31] MOGHETTI P, BACCHI E, BRANGANI C, et al. Metabolic effects of exercise [J]. Front Horm Res, 2016,47:44-57.